

Nome do medicamento: Laevolac 666,7 mg/ml xarope, Laevolac 10 g/15 ml xarope, Laevolac Ameixa 666,7 mg/ml xarope, Laevolac Ameixa 10 g/15 ml xarope. **Composição qualitativa e quantitativa:** Cada ml de xarope contém 666,7 mg de lactulose líquida. Cada ml de xarope contém aproximadamente 120 mg de lactose e aproximadamente 133,5 ml de galactose. **Forma Farmacêutica:** Xarope **Indicações terapêuticas:** obstipação crónica (em todos os casos). **Posologia:** Na medida em que cada organismo reage duma forma diferente ao Laevolac/Laevolac Ameixa, é necessário, para cada doente, determinar a dose ótima com o decorrer do tempo. A posologia média recomendada é de 30 ml de xarope (cada saqueta de 15 ml contém 10 g de lactulose; uma colher de sopa corresponde a 15 ml) em duas tomas, uma antes do pequeno-almoço e outra antes do almoço. *Adultos:* Dose inicial: 10-20 g de xarope <> 15-30 ml/dia (1-2 colheres de sopa ou 1-2 saquetas de 15 ml) em toma única ou dividida em duas tomas. Em manutenção, as doses são habitualmente reduzidas para metade isto é, 5-10 g <> 7,5-15 ml/dia (1/2 a 1 colher sopa/dia). *População pediátrica:* A dose inicial deverá ser: 5-10 anos: 10 ml em duas tomas diárias (uma colher de chá corresponde a 5 ml). 1-5 anos: 5 ml em duas tomas diárias (1 colher de chá). Idade inferior a 1 ano: 2,5 ml em duas tomas dia. **Modo de administração:** Para obter um efeito laxante rápido deve diluir-se 1-3 colheres de sopa de Laevolac/Laevolac Ameixa em 1/8 a 1/4 de litro de água, café, chá, sumos de fruta ou leite, tomado de manhã, em jejum. Os movimentos intestinais ocorrem geralmente cerca de 2 horas mais tarde, originando fezes pastosas ou líquidas (reflexo rápido de dejeção). Laevolac por si só, numa dose adequada, é capaz de eliminar uma obstipação grave. O efeito regulador do trânsito intestinal pode persistir durante vários dias em alguns doentes; neste caso é suficiente tomar em dias alternados ou de três em três dias. **Contraindicações:** Hipersensibilidade à lactulose ou a qualquer dos excipientes. Galactosemia, intolerância à lactose, dieta sem galactose, obstrução intestinal, suspeita de íleo. **Interações medicamentosas e outras formas de interação:** A ação de medicamentos que dependa do valor de pH do cólon poderá ficar inibida devido ao facto da lactulose provocar uma acidificação do conteúdo do cólon (baixa de pH). No caso de administração inapropriada de Laevolac/Laevolac Ameixa, o efeito dos digitálicos poderá ser potenciado devido à depleção de potássio. **Efeitos indesejáveis:** No início do tratamento poderá ocasionalmente ocorrer flatulência, cólicas e desconforto abdominal, que desaparecem rapidamente com a redução da dose. Também foram notificados sintomas como náuseas e vômitos, no caso de administração de doses elevadas. Podem ocorrer diarreias quando se administram doses excessivas. **Data da revisão do texto: 07/2023**
Titular de AIM: FERRAZ, LYNCE, ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 123 – Queluz de Baixo 2734-501 BARCARENA. NIF 500113270
Medicamento não sujeito a receita médica. Para mais informações deverá contactar o Titular da AIM.