

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RCM: Nome do medicamento: Calcimed D₃ 1000 mg / 880 UI comprimidos para mastigar. **Composição qualitativa e quantitativa:** Um comprimido para mastigar contém: 2500 mg de carbonato de cálcio (equivalente a 1000 mg de cálcio), e 8,8 mg de concentrado de colecalciferol (equivalente a 880 UI de vitamina D₃.) Excipientes com efeito conhecido: Contém 1 mg de aspartamo, 137,1 mg de sorbitol por comprimido. **Forma farmacêutica:** Comprimido para mastigar. **Indicações terapêuticas:** Prevenção e o tratamento da deficiência em vitamina D e cálcio nos idosos. Suplemento de vitamina D e cálcio e como um adjuvante para o tratamento de doentes com osteoporose específica e que estão em risco de terem uma deficiência em vitamina D e cálcio. **Posologia e modo de administração:** Adultos e idosos: 1 comprimido para mastigar diário Dosagem no compromisso hepático: Não é necessário ajustar a dosagem. Dosagem no compromisso renal: Não deve ser utilizado em doentes com insuficiência renal grave. Dosagem durante a gravidez: a toma diária não deve exceder 1,500 mg de cálcio e 600 U.I. de vitamina D₃. Por isso, a dosagem diária não deve exceder meio comprimido. **Modo de administração:** Via oral. Pode ser tomado a qualquer momento, com ou sem alimentos, os comprimidos devem ser mastigados e engolidos. Não se destina a ser utilizado em crianças ou adolescentes. **Contraindicações:** Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes; Hipercalcúria e hipercalcemia e doenças e/ou condições que levam à hipercalcúria e/ou à hipercalcemia; Nefrolitíase; Nefrocalcinose; Hipervitaminose D; Compromisso renal grave. Devido ao seu alto conteúdo de vitamina D, a utilização em crianças ou adolescentes não é indicada. **Efeitos indesejáveis:** Doenças do sistema imunitário: *Desconhecido:* Reações de hipersensibilidade como angioedema ou edema da laringe. Doenças do metabolismo e da nutrição: *Pouco frequentes:* Hipercalcemia, hipercalcúria. Doenças gastrointestinais: *Raras:* Náuseas, diarreia, dor abdominal, obstipação, flatulência, distensão abdominal. Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneas: *Raras:* Erupção cutânea, prurido, urticária. Data de revisão do texto: 07/2021. Medicamento Sujeito a Receita Médica. Comparticipado pelo escalão C. Para mais informações deverá contactar o representante local.