



NEUROBION®

REFERÊNCIAS

1. Rizvi A, Ahmad A, Rizvi Z. Efficacy of combination of Vitamin B1, B6 and B12 in Management of Diabetic Peripheral Neuropathy. *PJMHS*. 2013;7(3):801-803
2. Calderón-Ospina CA, Nava-Mesa MO. B Vitamins in the nervous system: Current knowledge of the biochemical modes of action and synergies of thiamine, pyridoxine, and cobalamin. *CNS Neurosci Ther*. 2020;26(1):5-13.

Informações essenciais compatíveis com o RCM - Neurobion comprimidos e injetável

Neurobion, comprimidos revestidos, 0,2 mg cianocobalamina + 200 mg piridoxina + 100 mg tiamina. Neurobion, solução injetável, 100 mg tiamina + 100 mg piridoxina + 1 mg cianocobalamina. **Indicações terapêuticas:** tratamento adjuvante da neurite e nevralgia (neuropatias), como nevralgia do trigêmeo, nevralgia intercostal, isquialgia, síndrome lombar, síndrome cervical, síndrome ombro-braço, nevrite radicular devido a doenças degenerativas da coluna vertebral e paresia facial. Prevenção e tratamento de deficiências de vitamina B1, B6 e/ou B12. **Posologia e modo de administração:** Comprimidos: 1 comprimido, 1 a 3 x/dia no tratamento de casos moderados, ou para administração intercalada e de seguimento do tratamento com a forma injetável. Engolir sem mastigar com um pouco de líquido durante ou após as refeições. Duração do tratamento: No caso de condições crônicas, o tratamento deve ser mantido por mais de 4 semanas. A duração do tratamento deve ser determinada pelo médico, tendo em conta a condição do doente. Injetável: injeção intramuscular, casos graves, 1 ampola/dia enquanto os sintomas agudos persistirem. Na terapêutica de seguimento, 2 a 3 ampolas/semana. Em caso de problemas de absorção prolongados e/ou necessidade de tratamento de longa duração, 1-3 injeções por semana. Quando não são administradas as ampolas ou como continuação da terapêutica pode utilizar-se Neurobion comprimidos revestidos. A posologia e a duração do tratamento devem ser definidas pelo médico. **Contraindicações:** hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Crianças com idade inferior a 18 anos. **Advertências e precauções especiais de utilização:** neuropatias após ingestão de longa duração (superior a 6-12 meses) com uma dose média diária de vitamina B6 > 50 mg. Recomenda-se uma monitorização regular do doente sob tratamento de longa duração. Quando por razões médicas, os doentes tomam doses elevadas de vitamina B6 ou fazem um tratamento de longa duração, pode fazer-se abstinência periódica do tratamento como medida de proteção. Comprimidos: não indicado em doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de lactase ou mal absorção de glucose-galactose. Injetável: contém menos de 39 mg de potássio e 41,97 mg de sódio/ampola. Precaução em doentes com ingestão controlada de sódio. Neurobion pode melhorar a anemia megaloblástica por deficiência de folato, é necessário precaução para não mascarar o diagnóstico. **Interações medicamentosas e outras formas de interação:** a vitamina B6 pode diminuir o efeito da L-DOPA. Antagonistas da piridoxina (ex., isoniazida, cicloserina, penicilamina, hidralazina) podem diminuir a eficácia da vitamina B6. Diuréticos da ansa de utilização prolongada (ex., furosemida), podem acelerar a eliminação e diminuir os níveis séricos da vitamina B1. Utilização de longa duração de agentes redutores da acidez pode levar à deficiência de vitamina B12. **Efeitos indesejáveis:** Desconhecidos (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis): Doenças do sistema imunitário - reações de hipersensibilidade, como sudação, taquicardia e reações cutâneas como prurido e urticária; Doenças gastrointestinais - náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal; Doenças renais e urinárias – cromatúria. Injetável: Doenças do sistema imunitário – choque anafilático (Muito raros, <1/10.000); Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos – casos isolados de acne ou eczema após a administração de doses de vitamina B12 por via parentérica (desconhecido); Perturbações gerais e alterações no local de administração – reações no local da injeção, como dor (desconhecido). **Titular de AIM:** P&G Health Germany GmbH. **Data da revisão do texto:** Comprimidos: 06/2023. Injetável: 01/2024. Medicamentos sujeitos a receita médica. Para mais informação deverá contactar o Titular de AIM. MAT-PT-NEUROBION-24-000010